

Radium 223 Xofigo®

Información al paciente

Su médico de cabecera ha decidido que la mejor alternativa en este momento para tratar las células de Cáncer de Próstata que se han diseminado a sus huesos es iniciar aplicaciones con Ra223 Xofigo®. Esta condición está conocida como cáncer con de próstata con metástasis ósea resistente a la castración. Ra223 Xofigo® tiene una pequeña cantidad de radioactividad que actuará directamente en las metástasis óseas.

¿De qué trata y como es el tratamiento que recibiré?

Xofigo® se administra por inyección intravenosa una vez cada 4 semanas. El tratamiento consiste en 6 inyecciones en total.

El tratamiento debe ser administrado directamente en el acceso venoso directo, no se podrá aplicar a través de un cateter central o Port-a-Cath.

La inyección se administrará durante un minuto.

- Previamente a iniciar la aplicación se verificará su recuento sanguíneo completo, peso, y se revisará cualquier efecto secundario posible.
- Si está recibiendo otros tratamientos para las lesiones óseas, su continuidad será evaluada por su médico de cabecera y el responsable de medicina nuclear.

Cuando debo contactar con mi médico de cabecera o asistir a un servicio de emergencia?

- Si presenta cualquier sangrado inusual o un sangrado mayor al usual después de una lesión.
- Aumento de la temperatura igual o mayor a 38.3 ° C en cualquier momento o mayor a 38.0 ° C por al menos una hora.

Cuáles son los efectos adversos posibles?

El tratamiento con Xofigo® puede causar:

- Disminución en el conteo de células sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y / o plaquetas).

Como saber si todo va bien? Se realizarán controles periódicos hematológicos para monitorear de forma cercana el posible efecto en las células sanguíneas.

Informe a su médico si tiene dificultad para respirar, presenta un cansancio mayor al habitual, presenta sangrados o moretones, o si tiene aumento de la temperatura igual o mayor a 38.3 ° C en cualquier momento o mayor a 38.0 ° C por al menos una hora.

- Diarrea (heces sueltas y líquidas). El material radioactivo administrado se elimina a través de sangre, heces, y orina.

Informe a su médico si tiene cambios en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento.

- Deshidratación, especialmente si tiene diarrea.

Qué debo hacer? mantenerme bien hidratado y beber mucho líquidos durante al menos 24 horas después de cada tratamiento.

Informe a su médico si presenta sequedad de boca o sed excesiva, ardor al orinar, vómitos o diarrea persistentes.

- Incremento transitorio del dolor

Qué debo hacer? comunicarme con mi médico de cabecera para que evalúe la posibilidad de añadir de forma transitoria medicación para el dolor.

¿Cómo puedo mantener a otros y a mí mismo a salvo durante mi tratamiento?

Durante la primera semana después de cada inyección de Xofigo®, podría haber algo de radioactividad en su sangre, orina y heces. Si bien no es necesario aislamiento de otras personas, se deberán tomar las precauciones de seguridad para limitar la exposición de fluidos corporales a familiares, amigos y personal de los servicios de salud:

Manejo de fluidos corporales

- Usar guantes médicos al limpiar el inodoro, limpiar derrames o manejo de ropa sucia.
- Lavar la ropa por separado durante la primera semana después de cada inyección.
- De preferencia orinar o evacuar sentado en el baño.
- Tirar de la cadena del inodoro dos veces.
- Asegúrese de lavarse bien las manos con agua y jabón después de usar el inodoro y limpiar los derrames.

Control de la natalidad

- Si es sexualmente activo, usar condones.
- Se deberá evitar el embarazo. Por tanto se deberá usar un método anticonceptivo efectivo durante el tiempo que dura el tratamiento y 6 meses posteriores a finalizar el mismo.

Seguridad radiológica

- Si necesita obtener muestras de sangre, orina o heces dentro de la primera semana después de la inyección, por favor notifique que recibió Ra223 al personal médico en el laboratorio.
 - Si tiene que ir a un médico, a la sala de emergencias, o necesita una intervención quirúrgica dentro de la primera semana después de una inyección, notifique al personal médico que recibió Radium 223.

Viajes planificados

Si planea viajar fuera de Buenos Aires dentro de las 4 semanas siguientes a una aplicación de Ra223, no olvide llevar el certificado de aplicación de dosis que le fue entregado posterior a cada aplicación. El Radio223 que permanece en su cuerpo puede ser detectado por determinados escaners de aeropuertos pudiendo desencadenar alarmas de seguridad.

PREGUNTAS Y EMERGENCIAS

Servicio de Medicina Nuclear:
Tel:

Médico Nuclear responsable:
Tel: email:

Médico de cabecera:
email:

Línea de atención de XOFIGO a pacientes: